

DWAIN C FEHON, CARLOS M GRILLO, DEBORAH S LIPSCHITZ (2005), A comparison of Adolescent Inpatients With and Without a History of Violence Perpetration: Impulsivity, PTSD, and Violence Risk, Nerv Ment Dis, 193(6)

E' stato studiato come l'essere sottoposti a violenza contribuisca allo sviluppo di comportamenti violenti. Sono stati studiati 130 adolescenti in ospedale psichiatrico, quindi sono stati comparati i dati relativi a quelli con storie di violenza con quelli senza una storia di violenza perpetrata. I perpetratori di violenza era molto più probabile che fossero stati vittime di violenza o testimoni di violenza in famiglia e nella comunità e hanno anche riportato un livello più alto di impulsività, dissociazione, PTSD associati ad un alto livello di violenza. Inoltre un'analisi della regressione multipla ha mostrato che i sintomi di impulsività e PTSD contribuiscono in modo significativo alla predizione di rischio di violenza. I dati indicano quindi che l'esposizione alla violenza ed al maltrattamento infantile sono eventi negativi comuni tra i pazienti adolescenti e che i sintomi di PTSD possono predisporre giovani traumatizzati a comportamenti impulsivi di violenza.

Parole chiave: *Violenza, adolescenti, PTSD, impulsività, pazienti psichiatrici*