

Fung H.W., Chien W.T., Ross C.A. (2023) The Relationship Between Dissociation and Complex Post-Traumatic Stress Disorder: A Scoping Review, *Trauma Violence and Abuse*, 24, 4, <https://doi.org/10.1177/15248380221120835>

La sindrome da stress post traumatico complesso (PTSD-C) è stata recentemente riconosciuta come una diagnosi psichiatrica ufficiale nel ICD11 dopo anni di ricerca nel campo. Si ipotizza che i sintomi dissociativi siano un fattore principale nel PTSD-C. Questa review ha lo scopo di riassumere la conoscenza esistente circa la relazione tra dissociazione e PTSD-C e identificare le carenze nella ricerca. Le domande a cui si vuole rispondere sono: 1. il PTSD-C è associato a sintomi dissociativi? 2. quanto sono comuni i sintomi dissociativi nella popolazione con PTSD-C? 3. quali sono i correlati dei sintomi dissociativi nella popolazione con PTSD-C? Sono stati inclusi in tutto 26 studi. In 10 studi si rileva che la popolazione con PTSD-C ha punteggi significativamente più alti nelle scale di misura della dissociazione rispetto ai controlli. 11 studi hanno riportato una correlazione positiva tra sintomi di PTSD-C e sintomi di dissociazione psicoforme o somatoforme. La dissociazione può anche essere associata con altre comorbidità della popolazione con PTSD-C. Sono necessari approfondimenti della ricerca.