

**DEBLINGER, E., MCLEER, S.V., ATKINS, M.S., RALPHE, D., FOA, E., (1989), Post-traumatic stress in sexually abused, physically abused, and nonabused children, Child Abuse & Neglect, 13, 403-408.**

Nell'articolo vengono comparati i sintomi del PTSD in bambini abusati sessualmente, fisicamente e ospedalizzati psichiatrici non abusati differenziando per età, sesso e status socio-economico. Tra i bambini abusati sessualmente il 20.7% soddisfa i criteri per la diagnosi di PTSD, contro il 6.8% nei bambini abusati fisicamente e il 10,3% nei bambini non abusati ma ospedalizzati. Nello specifico bambini abusati sessualmente esibiscono un numero significativo di comportamenti sessuali impropri rispetto ai bambini abusati fisicamente e ai bambini non abusati. Sia i bambini abusati sessualmente che quelli abusati fisicamente hanno mostrato una maggiore prevalenza di sintomi dissociativi rispetto ai bambini non abusati.

I risultati ottenuti vengono discussi considerando le implicazioni cliniche e scientifiche.

**Parole Chiave:** *abuso sessuale, maltrattamento, PTSD, ricerca, sintomi, comportamenti sessualizzati, dissociazione*