

Neumann E., Rixe J., Driessen M., Juckel G. (2023) Psychosocial functioning as a mediator between childhood trauma and symptom severity in patients with schizophrenia, *Child Abuse & Neglect*, 144, 106372.

*Traumi infantili, schizofrenia, fattori di mediazione della gravità*

C'è una evidenza empirica che i traumi subiti nell'infanzia siano associati con la gravità dei sintomi e del funzionamento psicosociale nella schizofrenia. Questo studio ha lo scopo di chiarire meglio queste associazioni. I partecipanti sono 253 pazienti ricoverati in 5 ospedali psichiatrici con diagnosi di schizofrenia. Le interviste cliniche sono state condotte con questi pazienti verso la fine della loro terapia. Il trauma infantile è stato valutato con il Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), una scala retrospettiva autosomministrata. I sintomi schizofrenici sono stati misurati con la Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) e il funzionamento psicosociale con la Personal and Social Performance Scale (PSP), ambedue valutate da esperti.

La maggioranza dei partecipanti aveva subito trauma nell'infanzia, il 91,7% ha riportato almeno un trauma. La presenza di un trauma nell'infanzia ha mostrato una piccola ma significativa correlazione con i sintomi positivi e la psicopatologia generale, e anche con il funzionamento psicosociale nelle aree occupazionale e sociale e nel controllo sul comportamento aggressivo. Il funzionamento psicosociale è risultato un mediatore dell'associazione tra il trauma nell'infanzia e la gravità dei sintomi, con una mediazione importante relativa ai sintomi positivi e una mediazione parziale relativa alla psicopatologia generale.

Questi dati suggeriscono che il buon funzionamento psicosociale mitiga l'impatto negativo del trauma infantile sulla gravità della patologia nei pazienti schizofrenici. Interventi terapeutici che possono promuovere le risorse personali e sociali sono quindi utili nel trattamento della schizofrenia.