

**EMANS, S.J., WOODS, E.R., FLAGG, N.T., FREEMAN, A. (1987), Genital findings in sexually abused, symptomatic and asymptomatic, girls, Pediatrics, 79, 5, 778-785.**

Sebbene l'esame della vulva di ragazze abusate sessualmente usando ingrandimenti con un colposcopio sia diventato sempre più diffuso, l'incidenza di vari problemi genitali in bambine sessualmente abusate e bambine asintomatiche non è ancora stata riportata. È stato eseguito uno studio prospettico in cui sono stati analizzati 20 problemi genitali presentati da 3 gruppi di ragazze (età media 4.8+/- 2.6). I tre gruppi erano (1) ragazze sessualmente abusate (n.= 119); (2) ragazze normali senza disturbi genitali (n.= 127); (3) ragazze con altri problemi genitali (n.= 59). Nel primo gruppo era più probabile rispetto al secondo gruppo trovare cicatrici all'imene o nella forchetta posteriore (9% contro 1% P=.002); una maggiore friabilità della forchetta posteriore (10% contro 1% P=.001); imene esile (18% contro 4% P=.003); e sinechie dall'anello dell'imene alla vagina (8% contro 0% P=.0009). I gruppi 1 e 3 erano decisamente simili con l'esclusione dell'eritema che era più diffuso nel gruppo 3 (34% contro 68% P=.0001). Il diametro dell'imene era leggermente più grande nel gruppo 1 rispetto al gruppo 2, ma non rispetto al gruppo 3. Sebbene le problematiche genitali distinguano alcune ragazze sessualmente abusate dalle ragazze asintomatiche, alcuni problemi vengono anche ritrovati in ragazze con altri disturbi genitali, il che suggerisce che molte di queste ragazze sono state molestate o che l'infiammazione della vulva potrebbe condurre ad alcune di queste problematiche.

**Parole Chiave:** *abuso sessuale, imene, esame genitale, segni fisici, visita ginecologica, colposcopio*