

KUMAR, G., STEER, R. A., DEBLINGER, E. (1996), Problems in differentiating sexually from nonsexually abused adolescent psychiatric inpatients by self-reported anxiety, depression, internalization, and externalization, Child Abuse & Neglect, 20, 11, 1079-1086.

Per accertare se le psicopatologie auto-riportate differenziano gli adolescenti abusati sessualmente da quelli non abusati, sono stati somministrati la Beck Depression Inventory, la Beck Anxiety Inventory, e l'Achenbach Youth Self Report a 111 adolescenti tra 13 e 17 anni, ricoverati in reparti psichiatrici e con diverse diagnosi. Sono stati anche raccolti dati riguardo a 14 background e caratteristiche cliniche che poteva essere significativo associare all'abuso sessuale. Il 67% delle ragazze e il 12% dei maschi ha riferito di essere stato abusato sessualmente. Nessuna delle scale ha una correlazione con uno dei sessi, ma una storia di abuso fisico è l'unica caratteristica significativamente correlata con l'abuso sessuale in entrambi i sessi. Inoltre nessuna delle scale è correlata con l'identità dell'abusante sessuale, con l'età al momento del primo abuso e quella dell'ultimo, con il numero degli abusi e i giorni dell'abuso, la penetrazione e il riferirlo alle autorità da parte delle ragazze abusate.

Parole Chiave: *adolescenti, ricovero, abuso sessuale, abuso fisico, maltrattamento, psicopatologia, scale autosomministrate, questionari*