

Noll JG, Felt J, Russotti J, Guastaferrò K, Day S, Fisher Z. (2025) Rates of Population-Level Child Sexual Abuse After a Community-Wide Preventive Intervention. *JAMA Pediatr.*;179(5):521–528. doi:10.1001/jamapediatrics.2024.6824

Gli sforzi di prevenzione primaria a livello di comunità possono ridurre i tassi di abuso sessuale sui minori (CSA) a livello di popolazione?

L'abuso sessuale sui minori (CSA) colpisce il 15% delle ragazze e l'8% dei ragazzi in tutto il mondo, comportando elevati costi pubblici e conseguenze devastanti per i sopravvissuti. I tassi di incidenza negli Stati Uniti sono rimasti stagnanti negli ultimi 15-20 anni, segnalando un estremo bisogno di innovazione nella prevenzione primaria. Nel 2024, la US Preventive Services Task Force ha riferito che non vi sono prove sufficienti dell'efficacia delle strategie di prevenzione degli abusi sui minori e nessuna ha mostrato una diminuzione dei tassi di incidenza a livello di popolazione.

Un intervento preventivo coordinato a livello di contea contro il CSA, rivolto a bambini, genitori e membri della comunità in 5 contee degli Stati Uniti, è stato valutato in uno studio di coorte di popolazione, valutato tramite un metodo di controllo sintetico. Dal 2018 al 2020, lo stato della Pennsylvania ha lanciato un intervento di prevenzione del CSA a tre livelli in 5 contee, che includeva: (1) l'esposizione del 5% della popolazione adulta (circa 72.000) a corsi di formazione online e di persona con una campagna mediatica a livello di contea, (2) l'erogazione di un programma di psicoeducazione al 100% degli studenti di seconda elementare (circa 17.000) e (3) la fornitura di formazione genitoriale al 100% dei genitori assistiti dal sistema di assistenza all'infanzia (circa 300). Le contee di intervento sono state abbinare a priori a 1 delle 5 contee di controllo in base alle dimensioni della popolazione e ai tassi di CSA pre-intervento. Sono stati esaminati i tassi aggregati di segnalazioni di CSA, sia comprovate che non comprovate, nelle contee di intervento e di controllo per 5 anni prima dell'intervento e 3 anni dopo l'intervento, con dati provenienti da un sistema informativo statale per l'assistenza all'infanzia

I tassi di CSA nella popolazione sono stati significativamente ridotti nelle contee oggetto dell'intervento, rispetto alle contee di controllo, sia per le segnalazioni di CSA comprovate che per quelle non comprovate.

Questi risultati forniscono prove convincenti del fatto che interventi coordinati e basati sul territorio possono modificare i tassi di CSA.