

Brogan KM, Falligant JM, Rapp JT. (2017) Interdependent Group Contingencies Decrease Adolescents' Disruptive Behaviors During Group Therapy: A Practitioner's Demonstration. *Behav Modif.*; 41(3):405-421. doi: 10.1177/0145445517693812. Epub 2017 Feb 15. PMID: 28201925.

Gli adolescenti che sono stati giudicati per comportamento sessuale illecito possono ricevere un trattamento che richiede la partecipazione a sessioni e corsi di terapia di gruppo. Per alcuni adolescenti, i comportamenti problematici non sessuali (ad esempio, sfoghi verbali, non compliance) interferiscono con la loro capacità di partecipare al trattamento di gruppo.

I ricercatori hanno utilizzato un disegno di studio multi-baseline tra gruppi con un disegno di studio a criteri variabili incorporato per valutare gli effetti di un sistema di premiazione o di punizione di gruppo sulla base del comportamento di uno o più componenti (interdependent group contingencies) sulla riduzione del comportamento dirompente negli adolescenti in due gruppi di terapia.

I risultati hanno indicato che la procedura è stata efficace nel ridurre il comportamento dirompente manifestato dagli adolescenti in terapia di gruppo. Le misure di validità sociale hanno indicato che sia i terapeuti che gli studenti hanno ritenuto accettabili le procedure e i risultati complessivi. Vengono discusse le implicazioni per questo tipo di procedure in diverse popolazioni.

Parole chiave: interdependent group contingencies; schema percentile; autori di reati sessuali.